



ستاد ملی مبارزه با دوپینگ  
جمهوری اسلامی ایران



فدراسیون پزشکی ورزشی  
جمهوری اسلامی ایران

# Athlete Wallet Card

## کارت جیبی راهنمای ورزشکار

# 2020



@i.s.medicine



@IranSportsmedicine

[www.ifsm.ir](http://www.ifsm.ir)

ifsm.ir

# کارت حیبی راهنمای ورزشکار

این کارت حاوی مثال‌هایی از داروهای مجاز شایع مصرفی توسط ورزشکاران و داروهای ممنوعه بر اساس فهرست ممنوعه، سال ۲۰۲۰ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ است؛ لذا ممکن است در سال‌های آینده مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد. برای مشاهده کامل فهرست ممنوعه سال ۲۰۲۰ می‌توانید به وب سایت رسمی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ [www.Iranado.ir](http://www.Iranado.ir) و پایگاه خبری تحلیلی پزشکی [www.ifsm.ir](http://www.ifsm.ir) مراجعه کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره دارویی، با تلفن ۱۶۳۶ ۲۶۲ تماس بگیرید.



# نمونه‌هایی از داروهای مجاز

## داروهای مسكن و ضد التهاب‌ها:

استامینوفن (پاراستامول) (Tylenol®)، ایبوبروفن (Advil®)، ژلوفن، نووافن، آسی芬، مفنامیک اسید، آ.س.آ. (اکسار) (Exedrin®)، استامینوفن کدئین، آ.اس.آ. (Aspirin®)، پرگابالین (Lyrica®)، هیدروکدون، ناپروکسن، پیروکسیکام، ترامادول، گاباپنتین (Neurontin®) و دیکلوفناک سدیم

## داروهای سرماخوردگی:

آنتری هیستامین دکونژستان، سیتریزین (Zyrtec®)، لوراتادین، کتوتیفین (Zaditen®)، کلماستین، فکسوفنادین، ترفنادین، اکسی متازولین، کلرفنیرآمین، دیفن هیدرامین، دیفن هیدرامین کمپاند، نفاژولین، فنیل افرین، گایافنزین، اکسیپکتورانت، استامینوفن کدئین، هیدروکدون، دکسترومیترووفان، برم هگزین، تئوفیلین (Coldex®) و ادالت کولد (Tussian®)

**توجه:** در ترکیب بعضی داروهای سرماخوردگی ماده ممنوعه پسودوافدرین وجود دارد که دارای حد آستانه مصرف در زمان مسابقه است و توصیه می‌شود ورزشکاران حداقل ۲۴ ساعت پس از زمان مسابقه،

صرف این داروها را قطع کنند.

## داروهای زخم معده:

رابپرازول(Nexium®)، اسماپرازول(Aciphex®)، اوامپرازول، لنزوپرازول (Lanzor®)، دکس لنزوپرازول (Zantac®)، رانیتیدین(Kapidex®)، فاموتیدین (Pepcid®)، نیزاتیدین (Axid®)، سوکرآلفیت (Carafate®)، الومینیوم-ام-جی (Mylanta®)، الومینیوم-ام-جی-اس(Maalox®) و کلینیدیوم-سی(Librax®)

## آرامبخش‌ها و خوابآورها:

دیازپام(Valium®)، اکسازپام(Ativan®)، لورازپام(Zanax®)، کلردیازپوكساید(Librium®)، آپرازولام(Restoril®)، تمازپام(Dalmane®)، فلوراپزام، تری فلؤئپرازین، مکلیزین ترازودون، هالوپریدول، تری فلؤئپرازین، دیفن هیدرامین (Ambien®)، زولپیدم(Antivert®)، اس زوپیکلون(Compoz®)، اس زوپیکلون(Lunesta®)

## آنتریوتیک‌ها:

تمام آنتریوتیک‌ها مانند پنی‌سیلین‌ها، پنی‌سیلین‌بنزاتین(Penador®)، آموکسی‌سیلین، آمپی‌سیلین، کواموکسی‌کلاو، سیپروفلوکساسین، سفیکسیم، سفالکسین، سفتی‌زوکسیم، سفتریاکسون،

اریترومایسین، آزیترومایسین (Zithromax®)، کلاریترومایسین (Klacid®)، جنتامایسین، مترونیدازول

### ضد اضطراب‌ها:

آلپرازولام (Librium®)، کلردازپوكساید (Zanax®)، دیازپام (Buspar®)، لوراپام، بوسپیرون (Valium®)، هیدروکسیزین (Atarax®)

### داروهای آسم:

سالبوتامول (Serevent®)، سالمترول (Ventolin®)، ایپراتروپیومبروماید (Atrovent®)، بودزوناید (Symbicort®)، فورموترول-بودزوناید (EntocortEC)، تئوفیلین، سالبوتامول-ایپراتروپیوم (Combivent®)، مونتلوكاست (Accolate®)، زفیرلوکاست (Singulair®)، فورموترول (Foradil®)

**توجه:** سالبوتامول، سالمترول و فورموترول فقط در صورت مصرف به فرم استنشاقی و با دوز معمول درمانی مجاز هستند.

### ضد اسهال‌ها:

دیفنوکسیلات، لوپرامید، کائولن-پکتین، پلانتاژل

### داروهای ضد دیابت:

گلیمیپراید (Amaryl®)، گلیکلازید (Avandia®)، رزیگلیتازون (Diamicran®)

آکاربوز، متفورمین (Glucophage®)، گلیبنکلامید (Actos®) (گلیبوراید)، پیوگلیتازون

### آنتری اسیدها:

آلومینیوم-ام-جی (Maalox®)، آلومینیوم-ام-جی-اس (Di-Gel®)، آلومینیوم هیدروکساید

### بی حس کننده‌ها:

لیدوکائین (Xylocaine®)، لیدوکائین - پی (Emla®)، لیدوکائین - اپی نفرین، لیدوکائین - اچ **توجه:** مصرف موضعی اپی نفرین (آدرنالین) به همراه ترکیبات بی حس کننده موضعی مانند لیدوکائین در دندانپزشکی و تجویز داخل بینی و داخل چشمی ممنوع نیست.

### ضد ویروس‌ها:

آمانتادین، اوسلاتامیویر (Tamiflu®)، زانامیویر (Zovirax®)، آسیکلولویر (Relenza®) وال سیکلولویر (Videx®)، دیدانوزین (Valtrex®)

### تنظیم کننده‌های اختلالات خلق و ضد افسردگی‌ها:

فلوکستین (Prozac®)، سیتالوپرام (Celexa®)، آمی تریپتیلین، نور تریپتیلین، ایمی پرامین، ریسپریدون، سرترالین (Risperdal®)، زولوفردال (Zoloft®)، دولوکستین (Seroxat®)، پاروکستین (Cymbalta®)

ترانیل‌سیپرامین، ونلافاکسین (Effexor®)، لیتیوم،  
بوپروپیون (Zyban®)، کوتئیاپین (Serequel®)،  
آریپپرازول (Abilify®)  
**ضد قارچ‌ها:**

کلوتریمازول، فلوکونازول، مایکونازول، تربینافین،  
تولنفتات، NNG

### داروهای ضد بارداری:

کنتراسپتیو ال-دی، کنتراسپتیو اچ-دی، کنتراسپتیو  
تری فازیک، مسترنول، لوونورژسترول، اتینیل  
استرادیول- دروسپیرنون (Yaz®) (Yasmin®)  
لاینسترول (Minilyn®)، دزوژسترول- اتینیل  
استرادیول (Marvelon®)

### داروهای شل کننده عضلانی:

باکلوفن، متوكاربامول (Robaxin®) ملوکسیکام  
(Flexeril®)، سیکلوبنزپرین (Mobic®)  
اورفنادرین (Norflex®)، سیکلوبنزپریل، کاریسوپرودول  
(Soma®)، تیزانیدین (Zanaflex®)، دانترولن،  
مپروبامات

### ملین‌ها:

بیزاکودیل (Dulcolax®)، منیزیوم هیدروکساید  
(شیر منیزیوم)، لاکتولوز، سوربیتول، موسیلیوم،

## پسیلیوم، انواع فرآورده‌های سنا (C-LAX®)، شربت انجیر (Fijan®) واکسن‌ها:

آبله مرغان، آنفلوآنزا فصلی، آنفلوآنزا H1N1،  
هپاتیت، کزاز، فلچ اطفال، سه گانه، هاری، سل،  
دیفتی، پنومونی، تیفوئید، پنوموکوک.

### داروهای ضد تهوع و سرگیجه:

متوکلوبپرامید (Plasil®)، ویتامین B6، تری اتیل  
پرازین، دیمن هیدرینات (Dramamine®)، مکلیزین  
(Compazine®)، پروکلرپرازین (Bonine®)

### داروهای ضد هموروئید:

کرم آنتی هموروئید، اکسید روی-اکسید بیسموت  
(Anusol®)، بنزوکائین، لیدوکائین اچ

**توجه:** کرم‌های آنتی هموروئید ممنوع نیست، اما  
صرف مقداری گلوکوکورتیکوئیدها (مانند شیاف  
آنتی هموروئید) ممنوع است.

### داروهای چشم، گوش و بینی:

نفازولین، فنیل آفرین، جنتامایسین، تتراسایکلین،  
آتروپین، هوماتروپین، اشک مصنوعی، کلامفینیکل،  
اکسی متازولین، نئوسینفرین، تتراهیدروزولین،  
دگزامتاژون، بتامتاژون، فلؤسینولون و تمام

**آنتی بیوتیک های چشمی و گوشی**

**توجه:** مصرف موضعی گلوکوکورتیکوئیدها در اشکال دارویی کرم، لوسیون و قطره های چشمی و گوشی و پوستی ممنوع نیست، اما مصارف سیستمیک گلوکوکورتیکوئیدها (کورتون ها) از راه دهان، از طریق تزریقات وریدی و عضلانی و از راه مقعد ممنوع است.

## مخاطرات مربوط به مصرف مکمل های غذایی

بسیاری از مکمل های غذایی (ویتامین ها، مواد معدنی، آمینو اسیدها، هومئوپات ها، داروهای گیاهی و نوشابه های انرژی زا) که در فروشگاه ها یا از طریق اینترنت به فروش می رسند، ممکن است حاوی مواد داروهایی باشند که روی برچسب آنها قید نشده ولی جزو فهرست ممنوعه باشند. وجود یک ماده ممنوعه در نمونه ورزشکار بدون توجه به چگونگی ورود ماده ممنوعه به بدن ورزشکار، تخلف از قوانین آنتی دوپینگ است. هر ورزشکاری که مکمل غذایی مصرف می کند، در معرض خطر آلودگی و محرومیت های ناشی از آن قرار دارد.

SAY  
NO!  
TO DOPING

په دوپینګ  
نه  
بکوپینګ

# نمونه‌هایی از داروهای ممنوعه بر اساس فهرست ممنوعه سال ۲۰۲۰ میلادی

[قابل اجرا و معتبر از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۱ دی ماه سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)]

## مواد ممنوعه حین و خارج از زمان مسابقه

### مواد فاقد تائیدیه:

ترکیبات دارویی که دارای تائیدیه رسمی از طرف مقامات ذیصلاح رسمی بهداشتی و دولتی برای مصرف درمانی در انسان نیستند.

### عوامل آنابولیک:

آندرواتاندیون، بولاسترون (دی‌متیل تستوسترون، مادول)، بولدنون، دانازول، دی‌هیدروپی آندوسترون (DHEA)، دروستانالون، استراتست، اپی‌تستوسترون، متاسترون، متیل ۱-تستوسترون، متیل تستوسترون، ناندرولون، نوربولتون، اکساندرولون، پروسستانوزول، استانوزول، تستوسترون، متاندینون (متان)، تتراهیدروژسترینون (THG)، تربنیلون و ترکیبات مشابه، تعديل کننده‌های انتخابی رسپتورهای آندروژن (SARMS).

### هورمون‌های پپتیدی، فاکتورهای رشد، مواد در ارتباط با آنها و مقلدها:

◆ عوامل تحریک کننده اریتروپوئز: اریتروپوئتین، داربی پوتین (dEPO)، پپتیدهای مقلد EPO)

متوكسی پولی اتيلن گلايكول-اپوئيتين بتا (CERA)

و آگونيزت های غیر اريتروپيتيك رسپتور EPO

◆ تثبيت کننده های فاكتور القاء کننده هيپوكسی (مانند:

کبالت و FG-4592 )

◆ گنادوتروپین های جفتی انسانی (CG)، هورمون لوتنینی (LH) و عوامل آزاد کننده آنها مانند گنادولین، بوسرلين و تريپتوريulin که فقط در مردان ممنوع هستند.

◆ كورتيكوتروفين ها و عوامل آزاد کننده آنها مانند كورتيكورلين

◆ هورمون رشد (GH) و شاخه ها و آزاد کننده آن شامل GHRH و آنالوگ های آن و ساير فاكتور های رشد شامل فاكتور های رشد فيربولاست (FGFs)، هپاتوسیت (HGF)، فاكتور رشد شبه انسولینی IGF-1 و آنالوگ های آن، فاكتور های رشد مکانو (MGFs)، فاكتور رشد مشتق شده از پلاکت (PDGF)، اندوتيلیال-وازکولار (VEGF) به علاوه دیگر فاكتور های رشد مؤثر بر ساخت یا تحلیل عضله، تاندون یا لیگامنت، ساخت عروق جدید، مصرف انرژی، ظرفیت بازسازی یا

تغییر و تبدیل نوع تار عضلانی

**بتادواگونسیت ها:**

آرفورموترول (Brovana®)، بامبوتوروول، بیتولتوروول،

پیربوترول (Brethaire®)، تربوتالین (Maxair®)، اورسیپرناالین، متاپروترنول (Laurent®)، رپروترول، فنوترونول، هایزنامین. سالبوتامول (Ventolin®) استنشاقی به میزان حداقل ۱۶۰۰ میکرو گرم طی ۲۴ ساعت، فورموترول (Foradil®) استنشاقی به میزان حداقل ۵۴ میکرو گرم طی ۲۴ ساعت و سالمترول (Serevent®) استنشاقی به میزان حداقل ۲۰۰ میکرو گرم طی ۲۴ ساعت، ممنوع هستند.

### تعديل کننده‌های هورمونی و متابولیک:

◆ مهار کننده‌های آروماتاز: آمینو گلوتیمید (Arimidex®)، آنساتروزول (Cytadren®)، آندرواستریون (6-Oxo)، آندروستاترین دیول، لترزول (Teslac®)، تستولاکتون (Femara®)، بیکالوتاماید (Aromasin®)، اکسومستان (Cosodex®)، فورمستان

◆ تعديل کننده‌های انتخابی گیرنده‌های استروژن: رالوکسیفن، تاموکسیفن، تورمیفن

◆ سایر مواد ضد استروژنی: کلومیفن، سیکلوفنیل، فولوسترانت

◆ عواملی که عمل یا اثرات مایوستاتین را تغییر داده یا تعديل می کنند مانند مهار کننده‌های مایوستاتین

◆ تعديل کننده‌های متابولیک:

✓ فعال کننده‌های AMP-activated protein

- ✓ آگونیست‌های (AICAR kinase (AMPK)
- ✓ Peroxisome Proliffrator Activated Receptor  $\sigma$  (PPAR $\sigma$ ) (GW 1516)
- ✓ انسولین‌ها و مقلدھای انسولین
- ✓ ملدونیوم
- ✓ تری متازیدین

### مواد مدر (دیورتیک‌ها) و عوامل پوشاننده:

◆ مواد مدر: استازولامید، آمیلوراید، بومتانید، کلرتیازید، هیدروکلروتیازید، فورسماید (Lasix®)، تریامترن اچ، اتاکرینیک اسید، متولازون، اسپیرونولاکتون و اسوپرسین، V2 آنتاگونیست‌ها (vaptans) و دیگر موادی که دارای ساختار شیمیایی مشابه یا اثرات بیولوژیک همسان هستند، به استثناء دروسپیرنون، پامابروم و مصرف چشمی دورزولاماید و نیزبرینزولاماید که ممنوع نیستند.

◆ عوامل پوشاننده: دسموپرسین، پروبنسید

◆ افزایش دهنده‌های حجم پلاسما: تجویز داخل وریدی آلبومین، دکستران، هیدوکسی‌اتیل‌استارچ و مانیتول و دیگر موادی که دارای اثر یا اثرات شیمیایی همسان یا ساختار شیمیایی مشابه باشند.

**توجه:** کاربرد موضعی فلیپرسین به عنوان بی‌حس‌کننده دندانی ممنوع نیست.

# روش‌های ممنوعه حین و خارج از زمان مسابقه دستکاری خون و ترکیبات خون:

- ◆ دوپینگ خونی: تجویز یا کاربرد مجدد خون اтолوگ (خودفرد)، آلوژنیک یا همولوگ (فرد دیگر)، هترولوگ (غیرانسانی) یا فراورده‌های گلبول قرمز با هر منشاء
- ◆ انتقال اکسیژن: استفاده از افزایش دهنده‌های مصنوعی جذب یا برداشت، انتقال و آزادسازی اکسیژن به عنوان مثال فرآورده‌های تغییر یافته هموگلوبینی که شامل ولی نه محدود به هموگلوبین گاوی با زنجیره جانبی، فرآورده‌های هموگلوبینی میکرواینک پسوله، پرفلوروکمیکال‌ها، افایپروکسیرال (RSR۱۳) هستند.
- ◆ هر شکل از دستکاری داخل عروقی خون یا ترکیبات خونی از طریق فیزیکی یا شیمیایی.

**توجه:** مصرف اکسیژن مکمل ممنوع نیست.

## دستکاری‌های فیزیکی و شیمیایی:

سوند گذاری، افزایش حجم، رقت یا تعویض نمونه، دستکاری یا قصد دستکاری نمونه یا فرم کنترل دوپینگ ورزشکار با این هدف که نمونه تغییر پیدا کرده یا عوض شود و صحت نمونه گرفته شده در خلال سلسله مراتب کنترل دوپینگ از بین برود.

**توجه:** انفوژیون‌های داخل وریدی و (یا) تزریقات بیش از ۱۰۰ میلی‌لیتر در دوره زمانی ۱۲ ساعته ممنوع است، بجز در مواردی که به صورت مجاز و قانونی در روند پذیرش بیمارستانی، اعمال جراحی و یا بررسی‌های کلینیکی صورت می‌گیرند. سایر موارد استفاده به ارائه TUE نیاز دارد. توالی خون گیری، دستکاری و وارد کردن مجدد خون کامل به داخل سیستم گردش خون نیز ممنوع است.

### دوپینگ ژنی:

انتقال پولیمرهای اسید نوکلئیک یا آنالوگ‌های اسید نوکلئیک و استفاده از سلول‌های طبیعی یا سلول‌هایی که از نظر ژنتیک تغییر یافته‌اند و دارای پتانسیل افزایش کارایی ورزشی هستند، ممنوع است.

### مواد ممنوعه « فقط » حین مسابقات

#### محرك‌ها:

آدرنالین (اپی نفرین)، آدرافینیل، آمودافینیل (Nuvigil®)، مدافینیل، آمفاتامین، متامفتامین (شیشه)، دکستروآمفاتامین (Dexedrine®)، بنزفتامین، متیلن دی اکسی متامفتامین (اکستازی یا MDAM)، کوکائین، افдра (ماهوانگ)، متیل فنیدیت (Ritalin®)، دکس‌متیل‌فنیدیت (Focalin®)، فن‌فلورآمین (Redactil®)، سیبیوترا مین (Pondimin®)، متیل

هگزان آمین (Geranium oil)، سلژیلین، فنترمن، پمولین، استرکنین، اکسی لوفرین و اتامیوان کاتین (نورپسودوافدرين)، افدرین و متیل افدرین و پسودوافدرين حد آستانه دارند و مقادير بيشتر از حد آستانه يعني به ترتيب غلظت هاي بيشتر از ۵، ۱۰ و ۱۵۰ ميكرو گرم در ميلی ليتر ادرار آنها ممنوع است.

**توجه:** مواد محرك زير در زمرة برنامه پايش (نظراري) ۲۰۲۰ قرار دارند و به عنوان مواد ممنوعه در نظر گرفته نشده‌اند: بوپروپيون، كافئين، نيكوتين، فنيل آفرين، فنيل پروپانول آمين، پيپرادول و سينفرين. همچنین مصارف موضعی مشتقات ايميدازول و تجويز موضعی آدنالين (به عنوان مثال داخل بینی و چشم) يا تجويز همزمان آن با بی‌حس‌کننده‌های موضعی ممنوع نیست.

#### مخدرها:

بوپرونورفيين (تمجيذك)، دكستروموراميد، ديامورفين (هروئين)، فنتانيل و مشتقات آن متادون، مورفين، اکسی کودون، اکسی مورفون، هييدرومورفون، پنتازوسين، پتيدين

**توجه:** ساير مخدراها ممنوع نیست.

#### کاناپينويدها:

کاناپيس، مارينول، حشيش، ماري جوانا، دلتا-۹-تتراهيدروکاناپينول (THC)

## گلوکوکورتیکوئیدها:

بتامتاژون، بتامتاژون LA، دگزامتاژون، تریامسینولون، متیل پردنیزولون (دیومدرول)، هیدروکورتیزون، پردنیزولون، پردنیزون، کلوبتاژول و سایر گلوکوکورتیکوئیدها در صورتی که از راه دهان، از طریق تزریقات وریدی و عضلانی یا از راه مقعد مصرف شوند، ممنوع هستند.

**توجه:** مصارف موضعی و تزریقات زیرجلدی، داخل و اطراف تاندون و یا مفاصل، استنشاق اسپری و یا سایر فرم‌های تنفسی گلوکوکورتیکوئیدها (کورتون‌ها) ممنوع نیست.

## مواد ممنوعه در ورزش‌های خاص

### بتابلوکرها:

آتنولول، لابتولول، کاروادیلول، اسمولول، پروپرانولول (Inderal®)، متیپرونولول، تیمولول، آلپرونولول، پیندولول، بتاکسالول و... بتابلوکرها « فقط هنگام مسابقات» و در رشته‌های ورزشی تیروکمان، اتومبیلرانی، بیلیارد، تیراندازی، دارت، گلف و اسکی / اسنوبورد (در بعضی رشته‌ها)، فدراسیون جهانی ورزش‌های زیر آب (در بعضی از رشته‌ها) ممنوع است.

**توجه:** بتابلوکرها در رشته‌های ورزشی تیروکمان و تیراندازی هم حین و هم زمان خارج مسابقه ممنوع است.